

Примерные тестовые задания для аттестации специалистов со средним медицинским образованием на получение (подтверждение) квалификационной категории по специальности «Общая практика»

Выберите один правильный ответ

"ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ АТОПИЧЕСКОЙ ФОРМЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

- аллергены инфекционного характера
- аллергены неинфекционного характера
- генетическая предрасположенность

"ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ НЕАТОПИЧЕСКОЙ ФОРМЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

- аллергены инфекционного характера
- аллергены неинфекционного характера
- генетическая предрасположенность

"ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

- гипертермия
- сильный кашель с гнойной мокротой
- дистанционные свистящие хрипы

"ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

- эмбриона
- кучера
- лягушки

"ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА С СУХИМ ПЛЕВРИТОМ

- выраженная одышка при нагрузке
- усиливающаяся при кашле боль в грудной клетке
- высокая температура по утрам

"ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В 1 МИНУТУ У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА В ПОКОЕ

- 4-6
- 16-20
- 39-40

"ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ – ЭТО КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА

- вводимое в легкие при каждом вдохе
- удаляемое из легкого при каждом выдохе
- вдыхаемое и выдыхаемое при спокойном дыхании

"ТИП ЛИХОРАДКИ ПРИ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ

- возвратная
- ремитирующая
- постоянная

"ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ МОКРОТЫ

- чистка зубов накануне вечером
- чистка зубов утром в день исследования
- полоскание полости рта без чистки зубов

"ПИКФЛОУМЕТРИЯ – МЕТОД, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОЦЕНИТЬ

- жизненную емкость легких
- состояние слизистой оболочки бронхов
- степень бронхиальной обструкции, реакцию бронхиальной стенки на ингаляцию противоастматических препаратов